

Parásitos del Intestino(IV)

Los Nematodirus(Lombrices)

M.V. Carlos H. Londoño

Asistencia Técnica

Están clasificados entre los nemátodos (parásitos de cuerpo redondeado y alargados, llamados "lombrices").

Los nematodirus miden de 1 a 3 centímetros, son delgados y su extremo anterior es más ancho. Los adultos se ubican en el intestino delgado. Las hembras ponen sus huevos que salen en la materia fecal, ya en el suelo, dentro de los huevos se desarrollan larvas. Los huevos con o sin larvas sobreviven en condiciones meteorológicas duras, incluso el congelamiento. Los huevos eclosionan (se abren) en primavera o en épocas de sol y clima cálido.

Cuando los animales pastan ingieren también larvas y huevos con larvas; éstas se convierten rápidamente en adultos. Sólo requieren entre 15 y 30 días para que aquellas larvas ingeridas sean adultos y las hembras estén listas para poner huevos.

Estos parásitos, literalmente, destruyen el intestino; por ello se producen diarreas, inapetencia, pérdida de peso, se disminuye la producción de leche y muy seguramente causarán el decomiso de vísceras.

Para el control es muy importante el adecuado pastoreo. El médico veterinario podrá prescribir fármacos que ayuden al control o que en último caso estén dirigidos al tratamiento de casos clínicos. 🐄

