

Parásitos del Intestino(I)

Las Tenias

M.V. Carlos H. Londoño L.
Asistencia Técnica

Las Tenias o Céstodos; tienen una cabeza (o escolex) y un cuerpo segmentado formado por anillos (o proglotides), pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo.

Se localizan en la pared del intestino adhiriéndose firmemente por su cabeza o escolex, y compiten con el huésped por la nutrición, representando pérdidas en producción de carne y leche.

Su ciclo de vida es largo, los ácaros son huéspedes intermediarios; ellos ingieren los huevos de las tenias que salen en la materia fecal de los bovinos, estos huevos demoran tres meses dentro de los ácaros para transformarse en larvas infectivas. Los bovinos ingieren los ácaros con el pasto y en ellos están las larvas infectivas. En 40 días se podrán encontrar tenias adultas en el intestino de los bovinos.

Aunque en nuestro medio no es un problema muy frecuente, los animales afectados no tendrán el

mismo desarrollo y producción de los sanos, se dice que con buena observación a veces pueden verse estructuras alargadas y segmentadas (como de anillos) en la materia fecal.

La ayuda del médico veterinario es importantísima ya que puede aconsejar medidas de manejo como separar los animales de mas lento desarrollo y los fármacos mas adecuados para el tratamiento de ellos además del apoyo para recuperar la condición y productividad de los afectados.



Ilustración: Dream Grafiks