

# ABC de las enfermedades parasitarias

Las enfermedades generadas por parásitos causan un mayor impacto económico, debido a su incidencia directa en la producción y mortalidad en los bovinos.

Les compartimos algunas de ellas:

## Enfermedades por parásitos internos



### Coccidiosis

- El **síntoma principal** es la pérdida de apetito y el signo es diarrea sanguinolenta de olor fétido.
- Para **prevenir** se debe mantener a los animales en condiciones salubres, tanto en el establo como en los potreros.
- El **tratamiento** consiste en el suministro de antibióticos, anticoccidiales o de sulfonamidas.

### Tricomoniasis

- Es **transmitida** durante la monta y afecta a los animales de ambos sexos.
- Un **síntoma** específico son secreciones vaginales blanquecinas.
- No hay **tratamiento** médico.




### Nemátodos gastrointestinales

- Los **animales afectados** padecen fuertes diarreas y trastornos digestivos, que reducen aún más su estado nutricional.
- Las **medidas de prevención** son: rotar las pasturas, separar los animales jóvenes de los adultos, evitar la sobrecarga de los pastos.

### Dictyocaulus viviparus

- Un **síntoma** común es bronquitis provocada por la irritación y en parte por la obstrucción de las vías respiratorias, así como disnea.
- Para **prevenir** se debe evitar el pastoreo de animales jóvenes, no hacerlo simultáneamente con los adultos y no pastorear en praderas en las que hubo casos.



### Fasciola hepática

- Como **síntoma** característico es que los animales presentan diarrea.
- Las **medidas de prevención** consisten en la aplicación de 3 a 6 kg de sulfato de cobre por hectárea.
- El **tratamiento** de los animales infectados consiste en administrar antiparasitarios específicos.

## RECUERDE

Se debe tener en cuenta que toda decisión que se tome en el aspecto sanitario en un hato o finca ganadera, debe ser bajo supervisión y previa orientación de un médico veterinario.



## Enfermedades por parásitos externos



### Miasis

- Se debe realizar un **control** de moscas adultas en las instalaciones existentes a través del uso de repelentes para insectos.
- El **tratamiento** puede ser la extracción de las larvas por medios físicos (pinzas), entre otros más técnicos.

### Anaplasmosis (hemoparásito)

- Los primeros **síntomas** de la enfermedad incluyen debilidad, falta de hambre, membranas mucosas de color pálido o amarillo, respiración rápida y aborto.
- Ajustar el calendario o plan sanitario para **prevenir**.
- Los antibióticos pertenecientes al grupo de las tetraciclinas son un **tratamiento** eficaz para anaplasmosis aguda.



### Babesiosis (fiebre de garrapata)

- Los animales **infectados** desarrollan anorexia y fiebre alta; pueden presentarse antes de que aparezcan otros signos clínicos.
- La babesiosis se puede **erradicar** mediante la eliminación de las garrapatas de los huéspedes.

### Infestación por Dermatobia

- Los animales que son **infectados** presentan mucho dolor al tocarles la piel, luego se observan constantes secreciones de pus.
- Para **tratar** existen diversos insecticidas sistémicos, como los organofosforados los cuales son para utilizarlos en baños por aspersión.



Fuentes: Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos  
Adaptado por: Alejandra Pichimata